ΚΙΝΔΥΝΟΣ



- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
•Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. •Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο. •«Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχουν στεγνώσει πλήρως τα φύλλα μετά τον ψεκασμό. Σε περίπτωση που οι εργάτες πρέπει να εισέλθουν στον αγρό σύντομα μετά τον ψεκασμό, θα πρέπει να φοράνε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία»

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: *Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.*
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: *Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.*
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: *Απομακρύνετε το θύμα για καθαρό αέρα και αφήστε το να ηρεμήσει. Εφαρμόστε τεχνική αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό.*
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: *Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα άμεσα. Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα ρούχα πριν ξαναφορεθούν.*
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: *Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Μην προκαλείτε εμετό.*
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

L1112582 GREC/12B PPE4197063

Score® 25 EC

syngenta®

GROUP 3 FUNGICIDE

UFI: MWC2-30Y9-J00X-M5K5

Difenoconazole
(Χημική ομάδα τριαζόλες - DMIs)

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):
60421/10-6-2014

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Difenoconazole 25% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 74,92% β/β

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:
Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49
Τηλ.: 210 6666612-13 - www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: Βl.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lt e

Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη:
- ***20 μέτρων*** *από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια της* ***ελιάς.***
- ***10 μέτρων*** *για την καλλιέργεια του* ***αμπελιού***
- ***15 μέτρων*** *για τις καλλιέργειες των* ***μηλοειδών (όψιμες εφαρμογές)***
- ***25 μέτρων*** *για τις καλλιέργειες των* ***μηλοειδών (πρώιμες εφαρμογές)****, της* ***κερασιάς*** *και της* ***δαμασκηνιάς***
- ***30 μέτρων*** *για τις καλλιέργειες της* ***βερικοκιάς*** *και της* ***ροδακινιάς.***
- ***12 μέτρων*** *από τα επιφανειακά νερά για τις καλλιέργειες των* ***ζαχαροτεύτλων****, του* ***παντζαριού****, των* ***ξερών φασολιών****, της* ***φακής****, των* ***ρεβιθιών*** *και των* ***λουπινων.***
- ***10-12 μέτρων*** *από τα επιφανειακά νερά σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση της διασποράς τουλάχιστον 50% για τις καλλιέργειες της* ***μελιτζάνας****, της* ***πιπεριάς****, του* ***αγγουριού****, του* ***κολοκυθιού****, του* ***πεπονιού****, του* ***καρπουζιού****, της* ***τομάτας****, της* ***φράουλας****, της* ***πατάτας****, της* ***γλυκοπατάτας****, του* ***κρεμμυδιού****, του* ***σκόρδου****, του* ***πράσου****, του* ***μαϊντανού****, της* ***αγκινάρας****, του* ***λάχανου****, του* ***κουνουπιδιού****, του* ***μπρόκολου****, των* ***λαχανακίων Βρυξελλών****, του* ***σέλερι****, των* ***φύλλων σέλινου****, των* ***φύλλων άνηθου*** *και του* ***σπαραγγιού.***
- ***20 μέτρων*** *από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια της* ***καστανιάς.***

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να χρησιμοποιείτε ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση της διασποράς τουλάχιστον 50% για τα ***σμέουρα*** *και τα* ***βατόμουρα.***

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Τρόπος δράσης: *Το SCORE 25EC είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Περιέχει το δραστικό συστατικό Difenoconazole (τριαζόλη) που κινείται διεαδασματικά και έχει προληπτική δράση. Καταπολεμά διάφορες μυκητολογικές ασθένειες σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιά, αμπέλι, λαχανικά, φράουλα, πατάτα, ζαχαρότευτλα, κρεμμύδι κα.*

Τρόπος εφαρμογής: *Ψεκασμός φυλλώματος.*

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: *Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του Score 25EC και ανακινείστε. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχάνημα και ειδικά τα ακροφύσια έχουν καθαριστεί πριν τον ψεκασμό. Τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει να ρυθμιστούν /ελεγχθούν με ακρίβεια για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση.*

L1112582 GREC/12B PPE4197063

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: *Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.*

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: *Το σκεύασμα SCORE 25EC είναι συμβατό σε προγράμματα IPM.*

Διαχείριση ανθεκτικότητας: *Περιέχει το δραστικό συστατικό difenoconazole. Το Difenoconazole ανήκει στην ομάδα των τριαζολών (DMIs) και στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο στάδιο της απομεθυλίωσης παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs.*
• Να μην γίνονται πάνω από το 50% των συνολικών εφαρμογών με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες που ανήκουν στις τριαζόλες.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: *Μέχρι ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.*

Φυτοτοξικότητα: *Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες και εγκεκριμένες δόσεις εφαρμογής.*

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:
Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσμουλιά, Κυδωνιά, Αγκινάρα (Α), Μπρόκολο (Α), Κουνουπίδι (Α), Κρεμμύδι (Α), Σκόρδο (Α), Μαϊντανός (Α/Θ), Σέλερυ (Α+Θ), Φύλλα σέλινου (Α/Θ), Φύλλα άνηθου (Α/Θ): *14 ημέρες,* ***Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Τομάτα (Α), Σμέουρα, Βατόμουρα, Βερικοκιά:*** *7 ημέρες,* ***Αμπέλι (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο), Λάχανο (Α), Πράσο (Α), Ζαχαρότευτλο, Παντζάρι, Λαχανάκια Βρυξελλών:*** *21 ημέρες,* ***Ελιά:*** *30 ημέρες,* ***Φράουλα (Α/Θ), Τομάτα (Θ), Αγγούρι (Α/Θ), Κολοκύθι (Α/Θ), Πεπόνι (Α/Θ), Καρπούζι (Α/Θ), Πατάτα, Γλυκοπατάτα, Μελιτζάνα (Α+Θ), Πιπεριά (Α+Θ):*** *3 ημέρες,* ***Όσπρια (Ξηρά φασόλια, Φακές, Ρεβύθι, Λούπινα), Κάστανο::*** *28 ημέρες,* ***Σπαράγγι, Καλλωπιστικά(Α/Θ):*** *δεν ορίζεται.*

Φάσμα δράσης (πεδίο εφαρμογής, στόχοι, δόσεις σκευάσματος, μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο, τρόπος & χρόνος εφαρμογής):
Μηλιά: *Για Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis) 15-20 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα/στρέμμα. 3 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα. Από την έναρξη της ανθοφορίας (περίπου το 10% των ανθέων έχει ανοίξει) έως το στάδιο της προχωρημένης ωρίμανσης (φάση έντονης απόκτησης του τυπικού χρωματισμού της ποικιλίας) (BBCH 61-84).*
Αχλαδιά, Μουσμουλιά, Κυδωνιά: *Για Φουζικλάδιο (Venturia pirina) 15-20 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα/στρέμμα. 3 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα. Από την έναρξη της ανθοφορίας (περίπου το 10% των ανθέων έχει ανοίξει) έως το στάδιο της προχωρημένης ωρίμανσης (φάση έντονης απόκτησης του τυπικού χρωματισμού της ποικιλίας) (BBCH 61-84).*
Ροδακινιά, Βερυκοκιά: *Για Φαία σήψη (Monilia sp.), Ωίδιο (Sphaerotheca sp.), Εξώασκο (Taphrina sp) 20-30 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 45 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα/στρέμμα. 2 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. Από την έναρξη της ανθοφορίας (BBCH 60) μέχρι 7 ημέρες από τη συγκομιδή.*
Δαμασκηνιά, Κερασιά: *Για Φαία σήψη (Monilia sp.), Ωίδιο (Sphaerotheca sp.), Εξώασκο (Taphrina sp) 20 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα/στρέμμα. 3 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα. Από την έναρξη της ανθοφορίας έως την έναρξη της συγκομιδής (BBCH 60-87).*
Ελιά: *Για Κυκλοκόνιο (Cycloconium sp.) και* ***χρήσεις ήσσονος σημασίας:*** *Γλοιοσπόριο (Colletotrichum gloeosporioides*, Colletotrichum acutatum*, Colletotrichum clavatum*) 50-60 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 80 λίτρα/στρέμμα. 2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. Έναρξη εφαρμογών όταν ο καρπός έχει αποκτήσει το 50% του τελικού του μεγέθους έως την ανάπτυξη του τυπικού χρωματισμού του καρπού (BBCH 75-85).*
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο): *Για Ωίδιο (Erysiphe necator), Μαύρη σήψη (Guignardia bidwellii) 12-20 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 20 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. 4 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα. Από την εμφάνιση του 2ου φύλλου έως τον περκασμό των ραγών (γυάλισμα) (BBCH 12-85).*
Φράουλα (Α+Θ): *Για Ωίδιο (Podosphaera sp.) 50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα για* ***Θερμοκηπίου*** *και 2 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα για* ***Αγρού****. Από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως τη δεύτερη συγκομιδή που οι περισσότεροι καρποί είναι χρωματισμένοι (BBCH 51-89).*
Σμέουρα, Βατόμουρα: *Για Ωίδιο (Podosphaera sp.), Δρεπανοπεζίζα (Drepanopeziza sp.), Μαύρη σήψη (Didymella sp.), Σκωρίαση (Phragmidium sp.) 30-40 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 40 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. 2 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. Από την έναρξη της ανάπτυξης των βλαστών έως την έναρξη του φουσκώματος των ανθοφόρων και φυλλοφόρων οφθαλμών (BBCH 31-49).*
Τομάτα (Α + Θ): *Για Αλτερναρίωση (Alternaria sp.), Ωίδιο (Leveillula sp.), Κλαδοσπορίωση (Cladosporium sp.) 50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το 70% των καρπών να αποκτήσουν τυπικό χρώμα ωρίμανσης (BBCH 20-87).*
Πεπόνι (Α/Θ), Καρπούζι (Α/Θ), Αγγούρι (Α/Θ), Κολοκύθι (Α/Θ): *Για Ωίδιο (Erysiphe sp. Sphaerotheca sp.) 50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. 3 εφαρμογές με 8 ημέρες μεσοδιάστημα.* ***Αγρού:*** *Από την εμφάνιση των πρώτων θηλυκών ανθέων έως το 60% των καρπών να έχουν αποκτήσει το τυπικό χρώμα ωρίμανσης (BBCH 51-86).*
Θερμοκηπίου: *Από την εμφάνιση του πρώτου πλάγιου βλαστού έως τη πλήρη ωρίμανση του καρπού (BBCH 21-89).*
Αγκινάρα: *Για Αλτερναρίωση (Alternaria sp.), Έλκος (Leptosphaeria maculans), Μυκοσφαιρέλλα (Mycosphaerella sp.), Ωίδιο (Erysiphe sp., Leveillula sp.) 50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. Από την έναρξη της ανάπτυξης της φυλλικής μάζας έως το 60% της μέγιστης φυλλικής μάζας (BBCH 40-46).*

Κουνουπίδι, Λάχανο: *Για Αλτερναρίωση (Alternaria sp.), Μυκοσφαιρέλλα (Mycosphaerella brassicicola) 50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. 3 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα. Από την έναρξη σχηματισμού της κεφαλής έως όπου φθάσει το 60% του τελικού της μεγέθους (BBCH 40-46).*

Μπρόκολο: *Για Αλτερναρίωση (Alternaria sp.), Ωίδιο (Erysiphe sp.), Έλκος (Leptosphaeria maculans), Μυκοσφαιρέλλα (Mycosphaerella brassicicola) 50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. 3 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα. Από την έναρξη σχηματισμού της κεφαλής έως όπου φθάσει το 60% του τελικού της μεγέθους (BBCH 40-46).*

Μαϊντανός (Α + Θ): *Για Σεπτόρια (Septoria sp.), Ωίδιο (Erysiphe heraclei, Erysiphe cichoracearum), Αλτερναρίωση (Alternaria sp.) 50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα.* ***Αγρού:*** *2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα.* ***Θερμοκηπίου:*** *3 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. Κατά το στάδιο της φυλλικής ανάπτυξης του φυτού (BBCH 40).*

Σέλερυ (Α+Θ): *Για Σεπτόρια (Septoria sp.) 50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. 3 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα για* ***Αγρού*** *και 2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα για* ***Θερμοκηπίου****. Κατά το στάδιο της φυλλικής ανάπτυξης του φυτού (BBCH 40-49).*

Κρεμμύδι, Σκόρδο: *Για Αλτερναρίωση (Alternaria sp.), Σκωρίαση (Puccinia allii) 50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. 2 εφαρμογές με 12 ημέρες μεσοδιάστημα. Έναρξη έως λήξη της βολβοποίησης (BBCH 40-49).*

Πράσο: *Για Αλτερναρίωση (Alternaria sp.), Σκωρίαση (Puccinia allii) 50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. 3 εφαρμογές με 12 ημέρες μεσοδιάστημα. Από έναρξη της ανάπτυξης του συγκομιζόμενου φυτικού μέρους έως το μήκος και η διάμετρος του βλαστού να φτάσουν το τυπικό τους μέγεθος. (BBCH 40-49).*

Σπαράγγι: *Για Σκωρίαση (Puccinia sp.), Στεμφύλιο (Stemphylium sp.) 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. 3 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. Όταν σταματήσει να αναπτύσσεται ο μακρύτερος βλαστός έως το τέλος της ανάπτυξης των καρπών (BBCH 41-89).*

Πατάτα, Γλυκοπατάτα: *Για Αλτερναρίωση (Alternaria sp.) 60 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. Από την έναρξη σχηματισμού των κονδύλων έως όπου οι πρώτοι καρποί να αποκτήσουν χαρακτηριστικό χρώμα (BBCH 40-85).*

Ζαχαρότευτλα, Παντζάρι: *Για Κερκοσπορίωση (Cercospora beticola), Ραμουλάρια (Ramularia beticola), Ωίδιο (Erysiphe betae), Σκωρίαση (Uromyces betae) 40-50 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. 3 εφαρμογές με 21 ημέρες μεσοδιάστημα. Από το στάδιο που τα φύλλα καλύπτουν το 10% της επιφάνειας του εδάφους έως τα τεύτλα/παντζάρια φτάσουν το τελικό μέγεθος για συγκομιδή (BBCH 31-49).*

Μελιτζάνα (Α+Θ), Πιπεριά (Α+Θ): *Για Αλτερναρίωση (Alternaria sp.), Ωίδιο (Leveillula sp.) 50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. 2 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα. Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το 70% των καρπών να αποκτήσουν τυπικό χρώμα ωρίμανσης (BBCH 20-87).*

Λαχανάκια Βρυξελλών: *Για Αλτερναρίωση (Alternaria sp.), Ωίδιο (Erysiphe sp.), Έλκος (Leptosphaeria maculans), Μυκοσφαιρέλλα (Mycosphaerella brassicicola) 50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. 2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. Από την έναρξη της ανάπτυξης των κεφαλών έως όπου το 70% των κεφαλών να έχουν κλείσει (BBCH 40-47).*

Όσπρια (Ξηρά φασόλια, Φακές, Ρεβύθι, Λούπινα): *Για Ασκοχύτωση (Ascochyta pisi), Μυκοσφαιρέλλα (Mycosphaerella sp.) 40 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 40-50 λίτρα/στρέμμα. 2 εφαρμογές με 21 ημέρες μεσοδιάστημα. Από το στάδιο εμφάνισης των πρώτων μπουμπουκιών έως όπου σχεδόν όλοι οι λοβοί έχουν φθάσει στο τελικό τους μέγεθος (BBCH 51-79).*

Καλλωπιστικά (Α/Θ): τριαντάφυλλα, χρυσάνθεμα, γαρύφαλλα, γλαδιόλα, καλεντούλα, ντάλια, βερόνικα, μπιγκόνια, ποτεντίλη, αγγελική, ευώνυμο, αλθαία: *Για Αλτερναρίωση (Alternaria sp.), Κερκοσπορίωση (Cercospora sp.), Ανθράκωση (Colletotrichum sp.), Ωίδιο (Erysiphe sp.), Σκωρίαση (Phragmidium sp., Uromyces sp., Puccinia sp., Phyllosticta sp.), Ραμουλάρια (Ramularia sp.), Σεπτόρια (Septoria sp.), Στεμφύλιο (Stemphylium sp.) 50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. 3 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. Με την έναρξη ανάπτυξης της βλάστησης έως την ωρίμανση των σπόρων/ καρπών (BBCH 40-89).*

Φύλλα σέλινου** (Α+Θ), Φύλλα άνηθου** (Α+Θ) (Χρήσεις ήσσονος σημασίας): *Για Σεπτόρια (Septoria sp.), Ωίδιο (Erysiphe heraclei, Erysiphe cichoracearum), Αλτερναρίωση (Alternaria sp.) 50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. 2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα για* ***Αγρού*** *και 3 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα για* ***Θερμοκηπίου****. Ψεκασμός φυλλώματος κατά το στάδιο της φυλλικής ανάπτυξης του φυτού (BBCH 40).*

Καστανιά** (Χρήση ήσσονος σημασίας): *Για Φαιά σήψη (Gnomoniopsis castaneae) 45 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα με όγκο ψεκ. υγρού 80-90 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογές από το τέλος της άνθησης και μέχρις ότου το 90% των καρπών πάρουν το τελικό τους μέγεθος (BBCH 69-79). Μέχρι 2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα.*

Παρατηρήσεις:

1. *Εφαρμόζετε την χαμηλότερη δόση όταν η πίεση του μολύσματος είναι χαμηλή και την υψηλότερη δόση όταν η πίεση του μολύσματος είναι μεγάλη (συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας).*
2. *Στα καλλωπιστικά, συνίσταται μια δοκιμαστική εφαρμογή πριν την καθολική εφαρμογή του σκευάσματος.*
3. ****«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στο γλοιοσπόριο της ελιάς. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».***
4. *****«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στα φύλλα σέλινου, τα φύλλα άνηθου και την καστανιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».***

